

Programme scolaire de vaccination

À QUOI S'ATTENDRE APRÈS AVOIR ÉTÉ VACCINÉ CONTRE :

l'hépatite B

le virus du papillome
humain (VPH 9)

le méningocoque
(vaccin quadrivalent)

le tétanos, la diphtérie et
la coqueluche acellulaire

EN CAS DE DOUTE, POSEZ DES QUESTIONS.

Si vous avez des questions sur les vaccins, ou si vous ne comprenez pas quelque chose, communiquez avec le bureau de la Santé publique de votre région. Vous trouverez les coordonnées des bureaux dans le livret du programme de vaccination des élèves.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DES VACCINS?

De nombreuses personnes n'ont aucun effet secondaire après la vaccination.

Les effets secondaires les plus courants sont une douleur, une rougeur ou une enflure à l'endroit de la piqûre.

Il y a d'autres effets secondaires moins fréquents, comme un léger mal de tête, une fièvre, des frissons, la diarrhée, des nausées, des douleurs généralisées, la fatigue et des articulations endolories ou enflées.

QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE RÉACTION OU DE FIÈVRE?

Après la vaccination, l'élève restera en observation pendant au moins 15 minutes, parce qu'il existe une faible possibilité qu'une réaction allergique grave se produise. Ce genre de réaction se produit généralement peu de temps après l'administration d'un vaccin.

En cas de réaction, l'infirmière présente pourra alors intervenir.

En cas de fièvre après le vaccin, il se peut que vous deviez vous-même traiter celle-ci à la maison. Assurez-vous par conséquent d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène chez vous.

Une fièvre n'est pas forcément mauvaise, mais elle peut être gênante. Si vous croyez que l'enfant a de la fièvre :

- Prenez sa température.
- Donnez-lui de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si sa température dépasse 38,5 °C (101 °F), et suivez les directives sur l'étiquette du flacon.
- Encouragez-le à boire PLUS que d'habitude, comme du jus ou de l'eau.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ OU COMPOSEZ LE 811 SI :

- la fièvre dure plus de 24 heures;
- l'enfant a une température de 39,5 °C (103 °F) ou plus;
- la fièvre ne baisse pas dans un délai de 15 à 45 minutes après la prise d'acétaminophène ou d'ibuprofène;
- l'enfant semble malade et présente d'autres symptômes.

Also available in English.