

## منظار القنوات المرارية والبنكرياس (ERCP)

### مستشفى فيكتوريا العام

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مخصصة لأهداف تثقيفية فقط. هذه المعلومات ليست معدة لكون أو تقوم مقام الرعاية الصحية أو المشورة الطبية. قد لا تتطابق هذه المعلومات على جميع الحالات. إذا كانت لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكنك العثور على هذا الدليل وكافة موارد المرضى التي نوفرها على الموقع التالي:

<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides>

(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

تواصل مع مرضيتك مجازاً بعنوان سكوكشا في أي وقت، عبر الاتصال على الرقم 811 أو زر

<https://811.novascotia.ca>

(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

(QE II) تو إيه كيو إيه من إعداد: وحدة طب الجهاز الهضمي، مستشفى فيكتوريا العام، مركز كيكي، 111 lifeART Super Anatomy 1 Images, Copyright © 1994, TechPool Studios Corp. USA من تصميم: خدمات مكتبة هيئة الصحة ببنوا سكوكشا

AR85-1476 © May 2024 Nova Scotia Health Authority  
To be reviewed May 2027 or sooner, if needed.



Also available in English: WI85-0038  
ERCP (Endoscopic Retrograde  
Cholangio-pancreatography) - VG Site



www.nshealth.ca

خلال الـ 24 ساعة (يوم 1) التي تلي التخدير:

- امتنع عن قيادة السيارة أو استخدام أي آلات ثقيلة.
- لا تشرب الكحول.
- لا تتول رعاية أي شخص (بما في ذلك الأطفال).
- لا توقع على أي أوراق قانونية أو هامة، أو تتدبر أي مالية (متعقة بالنقود).

اتصل بطبيبك المعالج في حال ظهور أي من الأعراض

التالية:

- 100.4
- > ألم في المعدة
  - > حمى (حرارة تتجاوز 38 درجة مئوية أو فهرنهايت)
  - > قشعريرة
  - > غثيان (رغبة بالقيء)
  - > تقيؤ
  - > براز أسود أو داكن جداً
- [إذا تغدر عليك التواصل مع طبيبك، توجه إلى أقرب قسم طوارئ فوراً.]

## ماذا سيحصل بعد انتهاء الفحص؟

- تقوم الممرضة بقياس ضغط دمك وبنضلك.
- يمكنك العودة إلى المنزل بعد مرور 1 إلى 2 ساعة تقريباً على إجراء الفحص.
- ستقوم الممرضة بإخراج أنبوب الحقن الوريدي قبل عودتك إلى المنزل.
- امتنع عن الأكل والشرب لمدة 3 ساعات بعد انتهاء الفحص.

- تناول فقط المشروبات الصافية (الماء، الشاي أو القهوة الداخلية من الحليب، عصير التفاح، مروقة الشوربة الصافية، عصير غاتوريد<sup>(6)</sup>) في الساعات المتبقية من النهار.
- ستحتمل من معاودة تناول وجباتك المعتادة في اليوم التالي من الفحص.



## في حال تم تخديرك:

- يجب أن يكون برفقتك شخص بالغ ومسؤول ليصحبك إلى المنزل بعد فحصك ويبقى معك طوال الليل.
- لا ترجع إلى منزلك سيراً على الأقدام. يُمكنك أن تستقل الحافلة أو سيارة أجرة في حال كنت برفقة شخص بالغ ومسؤول فقط.

## منظار القنوات المرارية والبنكرياس (ERCP)

### ما هو منظار القنوات المرارية والبنكرياس؟

- يتيح هذا الفحص معاينة:
  - > القناة الصفراوية المشتركة
  - > المريء
  - > القناة البنكرياسية
- يجري الأخصائي هذا الفحص بواسطة منظار داخلي (وهو عبارة عن أنبوب مرن مزود بضوء عند طرفه).



## ما هي مخاطر هذا الفحص؟

يعد منظار القوات المرارية والبنكرياس فحصاً منخفض المخاطر الغالية.

كما هو الحال في أي فحص، من المحتمل حدوث بعض المخاطر. ستحدث معك الأخصائي الذي يتابعك حول المخاطر قبل إجراء الفحص.

### تشمل المخاطر المحتملة:

> التهاب البنكرياس (التهاب أو عدوى تصيب البنكرياس)

(احتمال من 5 إلى 10%)

> تزيف (احتمال 1%)

> عدوى (احتمال 1%)

> حدوث مزرق في الأمعاء (احتمال لا يتجاوز 1%). في حال حدوث ذلك، قد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لمعالجة المرض.

> المضاعفات التي تتطلب البقاء في المستشفى (غير شائعة)

> ردة فعل على الدواء المخدر

> ألم و/أو تو RELATED: تزول هذه الأعراض خلال بضعة أيام.

> قد لا يتمكن الأخصائي من إتمام الفحص لأسباب تقنية

أخبر الأخصائي الذي يتابعك إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو الدرة.

## كيف يتم الفحص؟

- يتم إدخال أنبوب الحقن الوريدي في يدك أو في ذراعك. قد يتم إعطاؤك دواء لمساعدتك على الاسترخاء، إضافة إلى دواء مخفف للألم.
- قد يطلب منك الغرغرة أو قد يتم رش حجرتك بسائل يساعد على تخدير (تجميد) حجرتك. بعد تخدير حجرتك، لن تتمكن من الكلام لبعض الوقت. يساعد ذلك الأخصائي على إدخال المنظار الداخلي بسهولة أكبر.
- يقوم الأخصائي بتثمير المنظار الداخلي عبر الفم، المريء، المعدة والاثنا عشرى وصولاً إلى القناة الصفراوية المشتركة، والمراة، والقناة البنكرياسية.
- خلال مرور الأنبوب عبر حجرتك، قد تشعر برغبة في التقيؤ. ستكون قادرًا على التنفس بشكل طبيعي كما لم تشعر بأي ألم.
- سيسخدم الأخصائي منظاراً داخلياً لحقن مادة مشعة ثم التصوير بالأشعة السينية. تتيح الصور بالأشعة السينية رؤية القناة الصفراوية المشتركة والمراة والقناة البنكرياسية. قد يقوم الأخصائي أيضًا بإحداث شق صغير في الفتحة المشتركة لقنوات الكبد والبنكرياس.
- يستغرق الفحص 60 دقيقة تقريباً (1 ساعة).

كيف أستعد لهذا الفحص؟

- ستخضع للتخيير (إواء يساعدك على الاسترخاء) خلال هذا الفحص.
- ستحتاج إلى شخص بالغ ومسؤول:
  - > للبقاء معك في المستشفى أثناء خضوعك للفحص.
  - > لاصطحابك إلى المنزل بعد انتهاء الفحص.
  - > للبقاء معك طوال الليل.
- فقد نظر إلى إلغاء فحشك.

- أحضر معك إلى المستشفى قائمة بالأدوية التي تتناولها (بما في ذلك الأدوية التي تصرف بوصفة طبية أو بدونها، أجهزة الاستنشاق، الكريات، قطرات العين، اللصقات الجلدية، الأدوية العشبية، الفيتامينات، والمكملات الغذائية).
- امتنع عن وضع المجوهرات أو إحضار أي أغراض ثمينة لدى قدوتك إلى المستشفى. فالمستشفى ليست مسؤولة عن فقدان أي من أغراضك.
- لا تستخدم المنتجات العطرية. فهىئه الصحة في نواف سكوسا بيته خالية من الروائح العطرة.

أين أذهب لإجراء الفحص؟

- يجب التسجيل في الكشك الموجود في الطابق الرئيسي من كل من مبني ديسكون (المدخل الرئيسي) أو مبني سينتينيل (المدخل الرئيسي).

- قبل موعد الفحص:
  - سيحصل بك موظف الحجوزات لتزويحك بالمعلومات الازمة عن موعدك.
  - ستردوك باسم الأخصائي الذي سيقوم بإجراء الفحص لك والتاريخ والوقت ومكان إجراء فحسك.
  - اتخاذ الترتيبات اللازمة الحصول على إجازة من العمل في اليوم المحدد للفحص.
  - يمكن لمعظم الأشخاص العودة إلى العمل في اليوم التالي للفحص.
  - يتولى الأخصائي ترتيب موعد لك لإجراء تحليل دم.
- توجه بعدها إلى الطابق 9 من مبني فيكتوريا في مستشفى فيكتوريا العام. وقم بتأكيد حضورك في مكتب التسجيل.
- احرص على أن يكون لديك وقتاً كافياً لركن السيارة قبل حلول موعدك. فموافق السيارات محدودة في مستشفى فيكتوريا العام.

## في اليوم المحدد للفحص

من المهم جداً اتباع التعليمات التالية:

- اتصل بالأخصائي الذي يتابعك إذا كنت بحاجة إلى المضادات الحيوية للفحوصات أو لعلاج الأسنان. في حال لم تكن متأكداً، اسأل الأخصائي.
- أخبر موظف المجوزات والأخصائي في حال كنت تتناول الأدوية التالية، التي من شأنها أن تخاضع احتمالية حدوث نزيف:
  - < أدوية تسبيل الدم، كأسبيتيل سالسيباسيك أسيد (أسيبرين<sup>(®)</sup>)، وارفارين، هيبارلين (فراجمبين<sup>(®)</sup>)، ديفاغران (براداكس<sup>(®)</sup>)، ريفاروكسبابان (زيليتتو<sup>(®)</sup>)، أيبوكسبابان (إيكويوس<sup>(®)</sup>)، إوكسبابان (إيكسيبان<sup>(®)</sup>)

< مضادات تكثس الصفائح الدموية مثل كلوبيدوجرين (بلافيكس<sup>(®)</sup>)، برباسوغريل، تيكانجريلو (بريليتا<sup>(®)</sup>)

- أخبر الأخصائي في حال كنت تتناول أدوية و/أو الأنسولين للسكري. فقد تحتاج إلى اتباع تعليمات معينة بشأن كيفية تناول هذه الأدوية قبل الخضوع للفحص.
- أخبر الأخصائي في حال كنت تعاني من أي حساسية تجاه أدوية معينة.

في حال أردت إلغاء هذا الفحص، الرجاء الاتصال بنا لنتمكن من حجز هذا الموعد لمريض آخر.

< رقم الهاتف 902-473-6542

## في اليوم المحدد للفحص

من المهم جداً اتباع التعليمات التالية:

- امتنع عن الأكل والشرب بعد منتصف الليل في اليوم السابق لفحصك.

• في حال تم ترتيب موعد لك بعد الظهر، سيخبرك الأخصائي ما إذا كان بإمكانك تناول المشروبات الصافية قبل الساعة 8 صباحاً. تشمل المشروبات الصافية:

- < الماء
- < عصير التفاح
- < المشروبات الرياضية (مثل غاتوريد<sup>(®)</sup> أو باور إيد<sup>(®)</sup>) غير الحمراء اللون
- < المشروبات الغازية الصافية أو الفاتحة اللون (مثل سبرليت<sup>(®)</sup> أو جنجر أيل<sup>(®)</sup>)
- < الشاي (من دون حليب أو قشدة)

- في حال كنت تتناول أدوية القلب أو ضغط الدم أو التنفس، قم بتناولها كالمعتاد.
- أحضر معك إلى المستشفى لوازم فحص نسبة السكري في الدم إذا لزم الأمر.