

التنظير الكبسولي

مستشفى فيكتوريا العام

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مخصصة لأهداف تثقيفية فقط. هذه المعلومات ليست معدة لتكوين أو تقوم مقام الرعاية الصحية أو المشورة الطبية. قد لا تتطابق هذه المعلومات على جميع الحالات. إذا كانت لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكنك العثور على هذا الدليل وكافة موارد المرضى التي توفرها على الموقع التالي:
<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides>

(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

تواصل مع ممرضة مجازة بونفا سكوشنا في أي وقت، عبر الاتصال على الرقم 811 أو زيارة <https://811.novascotia.ca>
(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

من إعداد: وحدة التنظير الداخلي، كوه إيه تو (QE II)
الرسوم التوضيحية من:

LifeART Super Anatomy 1 Images, Copyright © 1994,
TechPool Studios Corp. USA

من تصميم: خدمات مكتبة هيئة الصحة بونفا سكوشنا

AR85-2462 © May 2024 Nova Scotia Health Authority
To be reviewed May 2027 or sooner, if needed.



www.nshealth.ca

Also available in English: W185-1300
Capsule Endoscopy - VG Site




إتصل بالأخصائي المعنوي بعلاجك أو مزود الرعاية الصحية الأولية الخاص بك في حال ظهرت عليك أي من هذه الأعراض بعد الفحص:

- > انتفاخ غير طبيعي
 - > ألم في المعدة
 - > غثيان (رغبة بالقيء)
 - > تقيؤ
 - > حمى (ارتفاع الحرارة إلى ما أكثر من 38 درجة مئوية أو 100.4 فهرنهايت)
 - > صعوبة في البلع
 - > ألم في الصدر
- في حال لم تتمكن من التواصل مع أي منهما، توجه إلى أقرب قسم للطوارئ على الفور.

التنظير الكبسولي

- لا تخضع لأي تصوير بالرنين المغناطيسي أو تمر عبر نقاط التفتيش في المطارات إلا بعد التأكيد من خروج الكبسولة. يمكنك التأكيد من ذلك إما من خلال رؤية الكبسولة في المرحاض أو عبر الخضوع للتصوير بالأشعة السينية.
 - < في حال لم تكن واثقاً من خروج الكبسولة، راجع الأخصائي المعنوي بعلاجك أو مزود الرعاية الصحية الأولية الخاص بك. من الممكن أن يطلب منك الخضوع لتصوير بالأشعة السينية للتأكد من الأمر.
- سوف يتصل بك الأخصائي المعنوي بعلاجك بشأن نتائج الفحص. قد يستغرق الأمر من 2 إلى 3 أسابيع.



- يستخدم هذا الفحص كبسولة في داخلها كاميرا وصوٌٍ.
- يجب أن تبتلع الكبسولة. تقوم بعدها الكاميرا بالتقاط الصور أثناء مرورها عبر السبيل الهضمي في جسمك.

- ثُرسن الصور التي تلقطها الكاميرا إلى جهاز تسجيل صغير . سوف تردي هذه الجهاز حول خصرك خلال اليوم المحدد للفحص.
 - يقوم أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الذي يجري التقطير البصري بمعاينة هذه الصور ، ليرسل بعدها تقديرًا إلى الطبيب الأخصائي المعنى بعلاجك ومزود الرعاية الصحية الأولية الخاص بك (طبيب العائلة أو المرضنة الممارسة).
 - لا تحمل أي أغراض ثقيلة (يزيد وزنها عن 10 أرطال) أو تمارس التمارين البدنية.
 - كن حذرًا حتى لا تفصل الجهاز . في حال حدوث ذلك ، من المحتلم فقدان الصور.
 - بعد مرور ساعتين (2) على ابتلاء الكبسولة، بإمكانك شرب السوائل الصافية وتناول أدويتك المعتادة.
 - بعد مرور 4 ساعات على ابتلاء الكبسولة، بإمكانك تناول لوجبة خفيفة (حساء أو سندويتش)
 - بعد مرور 8 ساعات، يجب العودة إلى عيادة التنظير الباطني الموجودة في الطابق 9 من مبني فيكتوري.
- لماذا أحتاج إلى إجراء هذا الفحص؟**
- إن السبب الأكثر شيوعاً لإجراء هذا الفحص هو العثور على سبب النزيف في الأمعاء الدقيقة.
 - من الممكن أيضًا أن تخضع لهذا الفحص لتشخيص:> المسالئ (كتل نسيجية صغيرة تتكون على أو في أحد أعضاء جسمك)
 - لا تشرب أي سوائل حمراء، بنفسجية أو خضراء اللون (بما في ذلك الجيلو®) لبقية اليوم.
 - ستقر البكسلة عبر الأمعاء (البراز). بإمكانك التخلص منها في المرحاض.
- > أعراض الأمعاء الالتهابية (مثل داء كرون)
- > التقرحات
- > الأورام
- > السبب وراء انخفاض مستوى الحديد، ألم المعدة، أو الإسهال (تبزز سائل أو مائي)

ما هي مخاطر هذا الفحص؟

سوف يطلعك الطبيب على المخاطر قبل الخضوع للفحص.

تشمل المخاطر المحتملة:

- من المحتمل أن تعلق الكبسولة أو لا تمر عبر السبيل الهضمي. إنه أمر نادر الحدوث (فاحتمال حدوث ذلك هو أقل من 10 في 1000)
- > في حال حدوث ذلك، قد تحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية لإخراج الكبسولة.
- قد تسبب الكاميرا تمزقاً في السبيل الهضمي، إلا أن هذا أمر نادر الحدوث.
- سنتيم وصالك بجهاز لتسجيل الصور. يكون الجهاز مزوداً بحزام من نوع فيلكلرو® تضعه حول خصرك إضافة إلى شنطة صغيرة تضعها على كتفك.
- سنتيم تزويدك بكثير التعليمات.
- يمكنك استعادة أنشطتك المعتادة بعد خروجك من المستشفى.

كيف يتم الفحص؟

- ستشرح لك إحدى الممرضات الفحص وتحبب على أسئلتك.
- ستردك بال kapsule التي يتعين عليك ابتلاعها.
- ستنقطع الكاميرا الصور أثناء مرورها في السبيل الهضمي في جسمك.

● سنتيم وصالك بجهاز لتسجيل الصور. يكون الجهاز مزوداً بحزام من نوع فيلكلرو® تضعه حول خصرك إضافة إلى شنطة صغيرة تضعها على كتفك.

● سنتيم تزويدك بكثير التعليمات.

● يمكنك استعادة أنشطتك المعتادة بعد خروجك من المستشفى.

- أحضر معك إلى المستشفى قائمة بالأدوية التي تتناولها (بما في ذلك الأدوية التي تصرف بصفة طبية أو بدونها، أجهزة الاستنشاق، الكريمات، قطرات العين، الصقات الجلدية، الأدوية العشبية، الفيتامينات، والمكمالت الغذائية).
- لا تستخدم المنتجات العطرية. فهيئة الصحة في نوفا سكوتيا هي بيئه خالية من الروائح العطرية.

لا يمكن الخضوع لهذا الفحص في حال:

- > كنت تعاني من انسداد معيوي، تضيق، أو ناسور (ثقب). أسأل مزود الرعاية الصحية الأولية الخاص بك (طبيب العائلة أو الممرضة الممارسة) في حال لم تكون متاكداً.
- > كنت حاملاً
- > تواجه صعوبة في البلع

في حال كنت تعاني من إحدى الحالات المذكورة أعلاه، اتصل على الرقم 902-473-2700 واطلب تحويلك إلى عيادة أخصائي الجهاز الهضمي قبل 72 ساعة (3 أيام) على الأقل من الموعد المحدد لفحصك. سوف يتم إلغاء الفحص إلى أن يتمكن أخصائي طب الجهاز الهضمي من التواصل مع الأخصائي المعنوي بعلاجك.

- أين أذهب للخضوع للفحص؟
- يجب عليك التسجيل في الكشك الموجود في الطابق الرئيسي من مبني ديكسون (المدخل الرئيسي) أو مبني سنتينيل (المدخل الرئيسي).
- توجه بعدها إلى الطابق 9 من مبني فيكتوريا في مستشفى فيكتوريا العام وقم بتسجيل الدخول في مكتب التسجيل.
 - احرص على أن يكون لديك وقتاً كافياً لركن السيارة قبل حلول موعدك. فموافق السيارات محدودة في مستشفى فيكتوريا العام.

كيف استعد لهذا الفحص؟

أسأل من فضلك. نحن هنا لمساعدتك.

في حال أردت أن تلغي فحشك، الرجاء الاتصال بالأخصائي المعنى بعلاجه وبعيادة طبيب أمراض الجهاز الهضمي قبل 3 أيام على الأقل (72 ساعة) من الموعد المحدد لفحشك. سيمنحنا هذه الوقت لجزر موعد لمريض آخر.

الأخصائي المعنى بعلاجي:

< رقم الهاتف:

عيادة أخصائي طب الجهاز الهضمي المعنى بمعتلي:

< هاتف: 902-473-3721

قبل 7 أيام (أسبوع) من موعد الفحص:

- في حال كنت تأخذ مكممات الحديد، توقف عن تناولها.
- بإمكانك الاستمرار في تناول الفيتامينات المتعددة التي تتحوى على الحديد.

في اليوم الذي يسبق موعد فحشك يمكنك شرب المشروبات الصافية فقط ما بين الظهر ولغاية الساعة 9 مساءً.

- تشمل المشروبات الصافية:
 - > الماء
 - > العصائر الصافية (кусصير التفاح)
 - > المشروبات الرياضية (مثل غيوريد® أو باوريد®)
 - > مرقة الشوربة الصافية
 - > جيلو
 - > المشروبات الغازية الصافية أو الفاتحة اللون (بيس الكولا)
 - > القهوة أو الشاي (من دون حليب أو قشدة)
 - > ألواح البودة بوسكالز®
 - > لا شرب أي سوائل حمراء، ينفسجية أو خضراء اللون.
 - > لا شرب الحليب، مبيض القهوة أو منتجات الحليب.
 - > لا تأكل أو تشرب ابتداءً من الساعة 9 مساءً ولغاية انتهاء الفحص في صباح اليوم التالي.
- إذا كنت تأخذ أي دواء في المساء، بإمكانك أن تأخذ مع كوب أو كوبين 250 إلى 500 مل (مل) من الماء.
- أبداً بشرب سائل تهيئة الأمعاء عند الساعة 5 من مساء اليوم السابق للفحص. ينصح هذا السائل السبيل المضمن لتمكين الكاميرا من التقاط صور واضحة.
- عليك أن تشرب ما يعادل 2 ليتر من سائل تهوية الأمعاء، مثل:
 - > غوياتيلي®
 - > كلين-بريب®
 - > كوليتب®
- يمكنك شراء هذه السوائل من متاجر بيع الأدوية أو الصيدليات.