

# التنظير الداخلي بالمواجات فوق الصوتية

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مخصصة لأهداف تثقيفية فقط. هذه المعلومات ليست معدة لتكوين أو تقوم مقام الرعاية الصحية أو المشورة الطبية. قد لا تتطابق هذه المعلومات على جميع الحالات. إذا كانت لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكنك العثور على هذا الدليل وكافة موارد المرضى التي توفرها على الموقع التالي:

<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides>

(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

تواصل مع ممرضة مجازة بنواف سكوتيا في أي وقت، عبر الاتصال على الرقم 811 أو زيارة

<https://811.novascotia.ca>

(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

من إعداد: وحدة التنظير الداخلي

Illustration by: LifeART Super Anatomy 1 Images,  
HealthCare 1 Images, Copyright © 1994,  
TechPool Studios Corp. USA

من تصميم: خدمات مكتبة هيئة الصحة بنواف سكوتيا

AR85-2463 © January 2023 Nova Scotia Health Authority  
To be reviewed January 2026 or sooner, if needed.



www.nshealth.ca



Also available in English: W185-1482  
Endoscopic Ultrasound

## **خلال 24 ساعة التالية (يوم بكماله):**

- امتنع عن قيادة السيارة أو استخدام أي الالات ثقيلة (مثل ماكينة قص العشب، شاحنة أو رافعة).
- لا تشرب الكحول.
- لا تتولّ رعاية أي شخص (مثل الأطفال أو المسندين من أعضاء عائلتك).
- لا توقع على أي أوراق قانونية أو هامة (قرض، رهن أو وصية).



## **ما هي مخاطر هذا الفحص؟**

- يزيد الدواء المخدر من احتمال حدوث مضاعفات على مستوى القلب و/أو الرئة (تسارع أو بطء ضربات القلب، خفقان القلب، مشاكل على مستوى التنفس).
- إن خطر التعرض لنزيف أو لمتمزق على مستوى السبيل الهضمي لا يتتجاوز 1%. في حال حدوث ذلك، قد تحتاج إلى عملية جراحية.
- في حال تم أخذ خزع (عينات) من البنكرياس، يتراوح خطر حدوث نزف، عدوى، و/أو التهاب (تورم) حاد (سيء جدًا) في البنكرياس من 1 إلى 2%.

تحدث مع طبيبك في حال كنت قلقًا بشأن هذه المخاطر.

# التَّنْظِيرُ الدَّاخِلِيُّ بِالْمَوْجَاتِ فَوْقَ الصُّوتِيَّةِ

ماذا سيحصل بعد انتهاء الفحص؟

- بعد انتهاء الفحص، سيمتهن نقالك إلى غرفة الإفاقة إلى أن يزول تأثير الدواء المخذل.
- في حال أخذ الطبيب خزعة، ستبقى في غرفة الإفاقة لمدة ساعة واحدة على الأقل.
- من الطبيعي أن تشعر بالإمتلاء أو برغبة بإطلاق الغازات بعد الإجراء.
- قد تلاحظ تغييراً في حركة الأمعاء (التغوط) المعتادة، بحيث يمكن أن يكون برازك ليناً.
- يجب أن يصحبك إلى المنزل شخص بالغ ومسؤول.
- لا ترجع إلى منزلك سيراً على الأقدام أو بالحافلة، بإمكانك أن تستقل سيارة أجرة في حال كنت برفقة شخص بالغ ومسؤول قادر على مساعدتك.

ما هو التنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية؟  
التَّنْظِيرُ الدَّاخِلِيُّ بِالْمَوْجَاتِ فَوْقَ الصُّوتِيَّةِ هو فحص يتبين رؤية ما يلي:

- > السبيل الهضمي العلوي (راجع التعريف في الصفحة 2)
- > البنكرياس
- > المرارة
- > الغدد الصفرافية
- > المذنف (تجويف في وسط الصدر)
- > المسقمة، عند الاقتضاء

ما هي أسئلتك؟  
إسأل من فضلك. نحن هنا لمساعدتك.


## كيف يتم إجراء الفحص؟

- يتم إدخال قسطرة وريدية (أنبوب صغير) في يدك أو في ذراعك. سوف يتم حقنك بدواء مضاد للقلق لمساعدتك على الاسترخاء، إضافة إلى دواء مخفف للألم.
- قد يتم رش حنجرتك برذاذ أو يُطلب منك الغرغرة بسائل يساعد على تخدير حنجرتك.
- يقوم الطبيب بتمرير أنبوب من عبر فمك ومعدتك وصولاً إلى أول قسم من أمعائك الدقيقة، أو إلى المستقيم.
- خلال مرور الأنبوب عبر حنجرتك، قد تشعر برغبة في التقيؤ. ستكون قادرًا على التنفس بشكل طبيعي.
- بعد وضع الأنبوب في مكانه، سيسقط المسبار موجات صوتية ليتمكن من التقاط صورة لأعضائك.
- يستغرق الفحص من 20 إلى 45 دقيقة تقريبًا.

## يشمل الجهاز الهضمي العلوي:

- < المريء (الأنبوب العضلي الذي يصل الفم بالمعدة [البطن])
- < المعدة
- < الأثنا عشرى (أول جزء من الأمعاء الدقيقة)

يُذكر عادة طبيبك المعالج على منطقة واحدة حيث يشتبه بوجود مشكلة.



يُستخدم في هذا الفحص مِنْظار داخلي (أنبوب مرن) مزود عند طرفه بضوء ومسبار (كاميرا دقيقة التصوير بالموجات فوق الصوتية).



- الرجاء الاتصال على الرقم 902-473-6666 في حال أردت إلغاء هذا الفحص لمن تمكّن من ترتيب موعد لمريض آخر في الوقت المحدد لك. الرجاء الإسغاء إلى الخيار المناسب لترك رسالة.
- امتنع عن وضع المجوهرات أو حمل أي أغراض ثمينة لدى حضورك إلى المستشفى. فالمستشفى ليست مسؤولة عن فقدان أي من أغراضك.
- لا تستخدم المنتجات العطرية (مثل العطور أو منتجات الشعير ذات الرائحة القوية). فهيئة الصحة في نوفاسكوشا بيته خالية من الروائح.

- أين أذهب لإجراء الفحص؟
- يجب عليك التسجيل في الكشك الموجود في الطابق الرئيسي من مبني ديكسون (المدخل الرئيسي) أو مبني سنتينيل (المدخل الرئيسي).
  - توجه بعدها إلى الطابق 9 من مبني فيكتوريا في مستشفى فيكتوريا العام رقم بتسجيل الدخول في مكتب التسجيل.
  - احرص على أن يكون لديك وقتًا كافياً لركن السيارة قبل حلول موعدك. فموافق السيارات محدودة في مستشفى فيكتوريا العام.

## كيف استعد للتنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية؟

- في حال كان التنظير الداخلي يشمل المستقيم، لا حاجة إلى الصيام لمدة 8 ساعات. عليك أن تستخدم حقنتين (2) شرجيتين من نوع فليت® (سائل تدخله في المستقيم المساعدة على التخلص من البراز وتنظيف الأمعاء) في المنزل قبل حضورك إلى الموعد. يجب استخدام الحقنة الشرجية الأولى في الليلة التي تسبق الموعد (بعد العشاء) والحقنة الشرجية الثانية قبل ساعتين (2) من الموعد.
- أحضر معك إلى المستشفى قائمة بالأدوية التي تتناولها (بما في ذلك الأدوية التي تصرف بوصفة طوال الليل. في حال لم يكن ذلك ممكناً، اتصل بالأخصائي المعنوي بعلاجه. فقد نظر إلى إغاثة طبية أو بدونها، أجهزة الاستنشاق، الكريديات، قطارات العين، اللصقات الجلدية، الأدوية العشبية، الفيتامينات، والمكمّلات الغذائية).
- أخبر فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن أي حساسيات تعاني منها.
- قد تحتاج إلى تناول مضاد حيوي بعد الفحص الوقائي من العدو. سوف يصف طبيبك ذلك إذا لزم الأمر.
- في حال كان التنظير الداخلي يشمل المستقيم، لا حاجة إلى الصيام لمدة 8 ساعات. عليك أن تستخدم حقنتين (2) شرجيتين من نوع فليت® (سائل تدخله في المستقيم المساعدة على التخلص من البراز وتنظيف الأمعاء) في المنزل قبل حضورك إلى الموعد. يجب استخدام الحقنة الشرجية الأولى في الليلة التي تسبق الموعد (بعد العشاء) والحقنة الشرجية الثانية قبل ساعتين (2) من الموعد.
- أحضر معك إلى المستشفى قائمة بالأدوية التي تتناولها (بما في ذلك الأدوية التي تصرف بوصفة طوال الليل. في حال لم يكن ذلك ممكناً، اتصل بالأخصائي المعنوي بعلاجه. فقد نظر إلى إغاثة طبية أو بدونها، أجهزة الاستنشاق، الكريديات، قطارات العين، اللصقات الجلدية، الأدوية العشبية، الفيتامينات، والمكمّلات الغذائية).
- أمتّن عن الأكل والشرب قبل 8 ساعات من الفحص.
- إذا كان موعد فحشك في الصباح، امتّن عن الأكل والشرب بعد الساعة الثانية عشر من الليلة التي تسبق موعد فحشك.